

# Anaftin<sup>®</sup> purškalas

„Anaftin“<sup>®</sup> purškalas padeda kontroliuoti mažų burnos pakenkimų sukeliama skausmą, pavyzdžiui, atsirandantį išsivysčius aftiniam stomatitui, aftinėms opoms, taip pat mažiems ortodontinių plokštelių ir netinkamai pritaikytų protezų sukeltiems pakenkimams. Purškalas taip pat tinka išplitusiu aftinių opų atvejais.

## Kaip veikia?

„Anaftin“<sup>®</sup> purškalo sudėtyje yra polivinilo piroolidono (PVP) ir hialurono rūgšties, sudarančių apsauginę plėvelę. Ji prilimpa prie burnos ertmės ir pažeistoms vietoms sudaro veiksmingą užtvarą, taip palengvindama dėl nervų galūnių dirginimo atsirandantį skausmą. Sudėtyje esanti hialurono rūgštis ir alavijai (*Aloe vera*) paspartina natūralų pakenktų audinių gijimą.

## Vartojimo nurodymai

Preparato vartodami pirmą kartą, nuimkite dangtelį ir uždėkite purkštuką. Purkštuką nukreipkite į burnoje esančią pažeistą vietą ir tris kartus arba tiek, kiek reikia, purškite preparato, kad padengtumėte pažeistą plotą. Kad pasiektumėte geriausią rezultatą, pasipurškę preparato mažiausiai 1 valandą nevalgykite ir negerkite. Purkštukas suteikia galimybę preparatu padengti burnos pažeidimus ir užtikrinti stipriausią poveikį.

Purškite 3-4 kartus per dieną arba dažniau, jei reikia.

## Sudėtyje yra:

*vandens*, propeno glikolio, polivinilo piroolidono (PVP), maltodekstrino, tikrojo alavijo (*Aloe barbadensis*), kalio sorbato, natrio

benzoato, PEG-40 hidrinto ricinos aliejaus, dinatrio EDTA, benzalkonio chlorido, natrio hialuronato, kvapiųjų medžiagų, natrio sacharino, dikalio glicirizato.

## Įspėjimai

„Anaftin“<sup>®</sup> purškalo negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas bet kuriai preparato sudėtyje esančiai medžiagai. Jei esate nėščia, prieš vartodama preparato, pasitarkite su gydytoju. Jei jus dažnai vargina burnos opos, rekomenduojama kreiptis medicininės pagalbos.

## Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Nevartokite, jei baigėsi galiojimo laikas arba jei atrodo, kad buteliukas pažeistas ar nesandarus. Laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Laikykite kambario temperatūroje, atokiau nuo tiesioginių šilumos šaltinių. Neužšaldykite. Stenkitės, kad preparato nepatektų į akis.

## Turiny

15 ml

## Gamintojas:

„Sinclair Pharma Srl“,  
Viale Restelli 5,  
20124 Milanas, Italija



## Platintojas:

BERLIN-CHEMIE AG  
(MENARINI GROUP),  
Glienicke Weg 125,  
12489 Berlynas, Vokietija

**Peržiūrėta 2014 m. spalio mėn.**